



# ORDONNANCE COLLECTIVE CHLOROQUINE

Date de mise en vigueur : Mars 2012

Date de révision : Mai 2018

## Référence à des documents :

- Guide d'intervention Santé-Voyage du Québec
- Information de l'INSPQ\*, du CCQSV\*, de l'OMS\*, du CDC\*, et du médecin responsable de la clinique de santé voyage.

## Professionnels habilités à exécuter l'ordonnance

- UNIQUEMENT les infirmières travaillant à la Coop Santé La Prairie qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.

Isabelle Nguyen, 99 1520 - Pauline Beauregard, 682357

**Secteur d'activité visé :** Clinique de Santé-Voyage

**Sites :** 675 chemin St-Jean, La Prairie, J5R 2L2

## Groupe de personnes visées ou situation visée :

- Voyageurs de tous âges et de toute condition (nourrisson, femme enceinte, mère qui allaite) se rendant en zone impaludée, où il n'y a pas de résistance connue à la chloroquine.

## Indication et condition d'initiation

- Tout voyageur se rendant dans un ou plusieurs pays à risque de contracter le paludisme. La durée de séjour ne représente aucune limitation à l'ordonnance.

## Intention thérapeutique

- Prévenir l'apparition d'épisodes de paludisme (malaria) lors d'un séjour en zone impaludée et durant les quatre semaines suivant son départ d'une telle zone.

## Limites - Référence au médecin

### Référer au médecin dans les situations suivantes :

- Toute contre-indication énumérée à la page suivante, à l'exception de la prise de Plaquenil® (Hydroxychloroquine) ou tout doute.

\*INSPQ: Institut National de Santé Publique du Québec

\*CCQSV: Comité consultatif Québécois pour la santé des voyageurs

\*OMS: Organisation mondiale de la Santé

\*CDC: Centers for Disease Control and Prevention

## Contre-indications

- Allergie ou hypersensibilité à la chloroquine, aux sulfamides, à l'hydroxychloroquine ou à la primaquine
- Antécédents de psoriasis généralisé
- Antécédents d'épilepsie
- Rétinopathie ou changement des champs visuels
- Prise de Plaquenil® (Hydroxychloroquine). *Ce dernier étant un médicament de substitution à la chloroquine, le voyageur se trouve donc adéquatement protégé.*
- Tout voyageur traité pour de l'acné ou de la rosacée avec de la Doxycycline ou de la Minocycline et qui poursuit cette médication durant le voyage.
- Porphyrisme
- Personne immunosupprimée (ex : VIH, Chimio, prise de médication immuno-suppressive)
- Syndrome congénital du QT long ou arythmie cardiaque.
- Maladie hépatique sévère ou prise de médicament connu toxique pour le foie ou alcoolisme.
- Prise d'un des médicaments suivants susceptibles de causer une prolongation de l'intervalle QT avec risque d'arythmies graves ou augmentation des concentrations sériques lors de la prise de la chloroquine. *(Se référer à Rx Vigilance, section chloroquine/mises en garde/médicaments pouvant allonger le QT. Considérer les médications avec risque de torsade de pointe carré rouge seulement).*
- Prise d'un médicament de la classe des phénothiazines dont l'efficacité est susceptible d'être réduite par la chloroquine :  
Chlorpromazine (Largatil®) – Methotrimeprazine (Nozinan®) – Trifluoperazine (Stelazine®) – Perphenazine (Trilafon®)  
Pericyazine (Neuleptil®) – Pipotiazine (Piportil®) – Fluphenazine (Modecate®, Moditen®) – Thioridazine (Mellaril®)
- Prise des médicaments suivants susceptibles d'interagir avec la Chloroquine :  
Ex: Méfloquine – Cimétidine – Sels d'aluminium ou de magnésium – Cyclosporine – Méthotrexate – Tamoxifène

### L'infirmière :

- Évalue le risque du voyageur de contracter le paludisme en consultant les documents et organismes cités dans cette ordonnance collective et en analysant les données sur le voyage dont il est question et les informations du profil de santé du client, compilées lors de la consultation-voyage.
- Évalue l'indication d'initier une ordonnance de Chloroquine d'après le profil de santé du voyageur.
- Informe le voyageur au sujet du paludisme et l'avise de consulter un médecin, s'il développe de la fièvre et ce, jusqu'à 3 mois après son retour.
- Informe le voyageur des autres moyens à prendre pour éviter les piqûres de moustiques.
- Informe le voyageur sur la façon de prendre le médicament et les effets secondaires potentiels. Remet un feuillet d'informations à cet effet (Annexe 2 et 3)
- Détermine la posologie adéquate (Annexe1A et 1B)
- Remplie la fiche de liaison et la remet au voyageur (Annexe 5)
- Remet la feuille d'information du Guide de Santé Voyage du Québec « Que faire si on pense avoir la Malaria » (Annexe 4).
- Si le médecin traitant est à l'extérieur de la Coop de Santé La Prairie, elle lui remet une fiche de liaison pour celui-ci.

---

Processus d'élaboration : **Mars 2012**

Processus de mise à jour : **Mai 2018**

Rédigé par : **Dre Isabelle Boily 88 183 8** - Médecin

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

jj/mm/aaaa

## CHLOROQUINE PHOSPHATE (ARALEN®)

<b>Nom générique</b>	CHLOROQUINE PHOSPHATE
<b>Classification</b>	Antipaludéen
<b>Mode d'action</b>	Agit au niveau de la phase érythrocytaire en tuant les schizontes sanguins.
<b>Présentation</b>	Comprimés de 250 mg (150 mg base)
<b>Prophylaxie</b>	Débuter une à deux semaines avant l'arrivée et poursuivre 4 semaines après le départ de la zone impaludée.
<b>Posologie pour adultes</b>	500 mg (2 comprimés de 250 mg) 1 fois/semaine avec de la nourriture.
<b>Posologie pour enfants</b>	<10 kg: ¼ comprimé de 250 mg 1 fois/semaine 10 à 19 kg: ½ comprimé de 250 mg 1 fois/semaine 20 à 30 kg: 1 comprimé de 250 mg 1 fois/semaine 31 à 45 kg: 1 ½ comprimé de 250 mg 1 fois/semaine 46 kg et plus: dose adulte
<b>Contre-indications</b>	Voir ordonnance collective
<b>Effets secondaires</b>	Voir Annexe 2
<b>Interchangeabilité</b>	250 mg (150mg base) de Chloroquine (Aralen®) est équivalent à 200 mg (155mg base) d'Hydroxychloroquine (Plaquenil®), qui peut être utilisé en cas de pénurie d'Aralen® (Chloroquine).

## HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUENIL®)

<b>Nom générique</b>	HYDROXYCHLOROQUINE
<b>Classification</b>	Antipaludéen
<b>Mode d'action</b>	Agit au niveau de la phase érythrocytaire en tuant les schizontes sanguins.
<b>Présentation</b>	Comprimés de 200 mg (150 mg base)
<b>Prophylaxie</b>	Débuter une à deux semaines avant l'arrivée et poursuivre 4 semaines après le départ de la zone impaludée.
<b>Posologie pour adultes</b>	400 mg (2 comprimés de 200 mg) 1 fois/semaine avec de la nourriture.
<b>Posologie pour enfants</b>	<10 kg: ¼ comprimé de 200 mg 1 fois/semaine 10 à 19 kg: ½ comprimé de 200 mg 1 fois/semaine 20 à 30 kg: 1 comprimé de 200 mg 1 fois/semaine 31 à 45 kg: 1 ½ comprimé de 200 mg 1 fois/semaine 46 kg et plus: dose adulte
<b>Contre-indications</b>	Voir ordonnance collective
<b>Effets secondaires</b>	Voir Annexe 2
<b>Interchangeabilité</b>	200mg (155mg base) d'hydroxychloroquine est équivalent à 250mg (150mg base) de Chloroquine (Aralen®). Utilisé en cas de pénurie.

### **Chloroquine (Aralen<sup>®</sup>, Plaquenil<sup>®</sup>)**

La majorité des voyageurs ne présentent aucun effet secondaire. À l'occasion, des maux d'estomac, des démangeaisons et des troubles visuels peuvent survenir. Ces effets sont en général mineurs et cesseront dès l'arrêt de la médication. On peut les atténuer en fractionnant la dose en deux prises à 3 ou 4 jours d'intervalle (ex: 1 comprimé le lundi et 1 comprimé le jeudi).

### INFORMATION SUR LA CHLOROQUINE (ARALEN<sup>®</sup>, PLAQUENIL<sup>®</sup>) HYDROXYCHLOROQUINE

Votre itinéraire de voyage comprend un séjour dans une zone où sévit le paludisme (appelé aussi malaria). Le paludisme est une source importante de maladie et de mortalité à l'étranger. Il s'agit d'une infection du sang causée par des parasites nommés Plasmodium qui sont transmis par une piqûre de moustique.

Il est possible de prévenir le paludisme par la prise régulière de médicaments. Comme aucun médicament n'est efficace à 100%, il est important de vous protéger des piqûres de moustiques : utilisez un chasse-moustique à base de DEET ou d'Icaridine, dormez sous une moustiquaire (de préférence imprégnée de perméthrine), évitez les produits de beauté parfumés, portez des vêtements longs et de couleur pâle et évitez les sorties nocturnes. Ces mesures sont aussi importantes que la prise de comprimés.

#### **La chloroquine (Aralen<sup>®</sup>) vous est recommandée selon la posologie suivante :**

**Adultes :** 2 comprimés de 250 mg (1 comprimé équivaut à 150 mg de base) par semaine.

**Enfants :** 5 mg/kg (base) une fois/semaine (maximum 2 co. De 150 mg base)

**<10 kg :** ¼ comprimé/semaine

**10 – 19 kg :** ½ comprimé/semaine

**20 – 30 kg :** 1 comprimé/semaine

**31 – 45 kg :** 1 ½ comprimé/semaine

**46 kg et plus :** dose adulte

#### **L'hydroxychloroquine (substitut) vous est recommandée selon la posologie suivante :**

**Adultes :** 2 comprimés de 200 mg (1 comprimé équivaut à 155 mg de base) par semaine.

**<10 kg :** ¼ comprimé/semaine

**10 – 19 kg :** ½ comprimé/semaine

**20 – 30 kg :** 1 comprimé/semaine

**31 – 45 kg :** 1 ½ comprimé/semaine

**46 kg et plus :** dose adulte

Les comprimés devraient être pris en même temps, toujours le même jour de la semaine, de préférence juste après un repas pour en faciliter la digestion. On doit commencer la médication une semaine (deux semaines si c'est la première fois) avant le départ et la poursuivre durant le séjour et jusqu'à quatre semaines après le retour. La chloroquine est sécuritaire pour la femme enceinte et le nourrisson. Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à de la nourriture pour en faciliter la prise.

#### **En cas de fièvre**

Malgré la prise d'une médication préventive, tout épisode aigu de fièvre pendant le séjour ou les 3 mois qui suivent le retour peut être un signe de paludisme. Le voyageur doit consulter immédiatement un médecin et l'informer de son séjour récent en zone tropicale.

### QUE FAIRE SI ON PENSE AVOIR LA MALARIA?

#### **Toute fièvre de plus de 38°C (100°F) durant ou après un séjour dans une région où sévit la malaria :**

- Devrait être considérée comme un signe d'une crise de malaria (paludisme) jusqu'à preuve du contraire, peu importe la présence ou l'absence d'autres symptômes.
- Nécessite une consultation médicale immédiate.

On peut se renseigner sur les ressources médicales compétentes à l'étranger auprès de l'Ambassade Canadienne ou, avant son départ, auprès de :

#### **IAMAT (International Association for Medical Assistance to Travellers)**

**40, Regal Road**

**Guelph (Ontario) N1K 1B5**

#### **Lors d'une consultation, lorsqu'on soupçonne une malaria :**

- Ne pas oublier d'apporter avec soi tous ses médicaments, y compris ceux prescrits pour prévenir la malaria, s'il y a lieu.
- Le diagnostic de la malaria se fera à l'aide d'un test sanguin, appelé frottis sanguin.
- Il est impossible de poser un diagnostic certain de malaria sans une analyse de sang qui permet de détecter les parasites.
- Si un diagnostic de malaria est posé, le traitement doit débiter immédiatement.

#### **TRAITEMENT DE LA MALARIA**

##### **Le traitement à utiliser pour une crise de malaria dépendra :**

- Du type de parasite en cause.
- Il existe cinq types de parasites que le frottis sanguin permet de différencier; le Plasmodium falciparum est de loin le plus dangereux.
- Des médicaments pris en prévention et de la région du monde visitée.
- De la sévérité de la crise palustre.

##### **Une fois le traitement de la malaria terminé :**

- Si le voyage en région où sévit la malaria se poursuit, ne pas oublier de reprendre immédiatement le traitement préventif contre la malaria, tel qu'il a été prescrit.
- Il est prudent de consulter dans une clinique de médecine tropicale ou une clinique de santé voyage durant le voyage ou au retour, car certaines formes de malaria nécessitent un deuxième traitement pour éliminer les parasites du foie.

<https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide/outils/malaria>





# INITIER UNE ORDONNANCE DE CHLOROQUINE (ARALEN®) OU HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUENIL®)

Date: \_\_\_\_\_  
jj/mm/aaaa

Nom: \_\_\_\_\_ Prénom: \_\_\_\_\_ Sexe: M  F

Téléphone: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Date de naissance: \_\_\_\_\_ RAMQ: \_\_\_\_\_  
jj/mm/aaaa

Allergie(s): \_\_\_\_\_

J'ai procédé à l'évaluation de la personne ci-haut mentionnée et elle est une candidate à la prise de de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Il n'y a aucune contre-indication à la prise de cette médication.

Cette personne a reçu l'enseignement relatif à la prise de cette médication et des effets secondaires potentiels.

Prophylaxie à débiter 1 semaine avant le départ, continuer durant le séjour et 4 semaines après le départ de la zone impaludée.

Prophylaxie à débiter 2 semaines (pour essai) avant le départ, continuer durant le séjour et 4 semaines après le départ de la zone impaludée.

## POSOLOGIE:

### (ARALEN®) Chloroquine

- Adultes:** 2 comprimés de 250 mg, 1 fois/semaine
- Enfants <10 kg:** ¼ comprimé de 250 mg 1 fois/semaine
- Enfants 10 – 19 kg:** ½ comprimé de 250 mg 1 fois/sem
- Enfants 20 – 30 kg:** 1 comprimé de 250 mg 1 fois/sem
- Enfants 31 – 45 kg:** 1 ½ comprimé de 250 mg 1 fois/sem
- Enfants 46 kg et plus:** dose adulte

### \*(Plaquenil®) Hydroxychloroquine

- Adultes:** 2 comprimés de 200 mg, 1 fois/semaine
- Enfants <10 kg:** ¼ comprimé de 200 mg 1 fois/semaine
- Enfants 10 – 19 kg:** ½ comprimé de 200 mg 1 fois/sem
- Enfants 20 – 30 kg:** 1 comprimé de 200 mg 1 fois/sem
- Enfants 31 – 45 kg:** 1 ½ comprimé de 200 mg 1 fois/sem
- Enfants 46 kg et plus:** dose adulte

# comprimés: \_\_\_\_\_

Nombre de semaines en zone impaludée: \_\_\_\_\_

\*Note: Le Plaquenil® est utilisé en cas de pénurie du manufacturier seulement.

Nom et prénom de l'infirmier(ère): \_\_\_\_\_

No. de permis OIIQ: \_\_\_\_\_ Téléphone: **450 444-1927**

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

jj/mm/aaaa

Médecin répondant: **Dre Isabelle Boily**

No. de permis: **88 183 8**

Téléphone: **450 444-2002**

Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

jj/mm/aaaa