



ORDONNANCE COLLECTIVE

CIPROFLOXACINE (CIPRO®)

Date de mise en vigueur : Mars 2012

Date de révision : Mars 2018

Référence à des documents :

- Guide d'intervention Santé-Voyage du Québec
- Information de l'INSPQ*, du CCQSV*, de l'OMS*, du CDC*, et du médecin responsable de la clinique de santé voyage.

Professionnels habilités à exécuter l'ordonnance

- **UNIQUEMENT** les infirmières travaillant à la Coop Santé La Prairie qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.

Isabelle Nguyen, 99 1520 - Pauline Beauregard, 682357

Secteur d'activité visé : Clinique de Santé-Voyage

Sites : 675 chemin St-Jean, La Prairie, J5R 2L2

Groupe de personnes visées ou situation visée :

- Patient adulte (16 ans et plus) prévoyant un voyage à risque de diarrhée du voyageur.

Indication et condition d'initiation

- Initier et préparer une ordonnance de Ciprofloxacine sur réception de la fiche de liaison réalisée **UNIQUEMENT** par les infirmières employées par la COOP de Santé La Prairie.

Limites - Référence au médecin

Référer au médecin dans les situations suivantes :

- Toute contre-indication énumérée à la page suivante ou tout doute.

Intention thérapeutique

- Traiter un épisode de diarrhée des voyageurs, dans l'éventualité où un patient en souffrirait durant son voyage.

Posologie et directives

- Débuter l'antibiothérapie si diarrhée modérée à sévère ou qui ne s'améliore pas après 24 heures.

CIPRO® 500MG

Adulte (16 ans et plus)

1 comprimés 2 fois par jour 1 à 3 jours.

CIPRO® XL 500 MG

Adulte (16 ans et plus)

2 comprimés 1 fois par jour 1 à 3 jours.

CIPRO® XL 1000 MG

Adulte (16 ans et plus)

1 comprimés 1 fois par jour 1 à 3 jours.

*INSPQ: Institut National de Santé Publique du Québec

*CCQSV: Comité consultatif Québécois pour la santé des voyageurs

*OMS: Organisation mondiale de la Santé

*CDC: Centers for Disease Control and Prevention

Contre-indications

- Grossesse ou allaitement
- Insuffisance rénale ou hépatique
- Myasthénie grave
- Épilepsie ou antécédents de convulsions
- Trouble du rythme cardiaque
- Maladie du QT long ou prise d'une autre médication déjà connue pour allonger le QT (*se référer à Rx Vigilance section ciprofloxacin/mise en garde/médicaments pouvant allonger l'intervalle QT. Considérer les médicaments avec risque de torsade de pointe carré rouge seulement*).
- Allergie à la Ciprofloxacin (Cipro®) ou à une autre quinolone :
Ex: Levofloxacin (Levaquin®) – Moxifloxacin (Avelox®) – Norfloxacin (Noroxin®) – Ofloxacin (Floxin®, Ocuflor®)
- Prise de certains médicaments :
Warfarine (Coumadin®) – Tizanidine (Zanaflex®) – Théophylline (Théodur®) et dérivés – Antiacides (Aluminium, Calcium, Magnésium) – Carbamazépine (Tégréto®) – Clozapine – Cyclosporine – Duloxétine (Cymbalta®) – Ibrutinib – Lomitapide – Methadone – Methotrexate – Olanzapine – Pifénidone (Esbriet®) – Pomalidomide – Procainamide – Pantoxifylline (Trental®) – Ropinirole – Rasagiline – Sevelamer (Renagel®, Renvela®) – Sidénafil et dérivés (Viagra®, Cialis®, etc.) – Sucralfate – Venetoclax – Zinc

PRÉCAUTION:

Des atteintes tendineuses et des ruptures de tendon ont été associées à la prise de quinolones.

Elles sont plus fréquentes chez les personnes suivantes:

- Plus de 60 ans
- Arthrite rhumatoïde
- Antécédents de problèmes tendineux
- Sportifs et athlètes de hauts niveaux

La suspension des activités pendant une semaine suite à la prise devrait être discutée. Le recours à une autre médication pourrait être envisagée chez les athlètes de haut niveau ou chez les voyageurs susceptibles de faire des efforts particulièrement exigeants.

Directives de l'infirmière

L'infirmière :

- Évalue le risque du voyageur de développer une diarrhée selon la destination de son voyage et son profil de santé.
- Évalue l'indication d'initier une ordonnance de ciprofloxacine d'après le profil de santé du voyageur et de sa destination.
- Informe le voyageur sur la conduite à tenir s'il présente une ou des diarrhées et lui remet le feuillet d'information (Annexe 2).
- Remet le feuillet d'information de l'antibiotique (Annexe 3).
- Informe la personne sur la façon de prendre la ciprofloxacine et des effets secondaires.
- Initie l'ordonnance à l'aide de la fiche de liaison et la remet au patient (Annexe 5).
- Si le médecin traitant est à l'extérieur de la Coop de Santé La Prairie, elle lui remet une fiche de liaison pour celui-ci.

Processus d'élaboration : **Mars 2012**

Processus de mise à jour : **Mars 2018**

Rédigé par : **Dre Isabelle Boily 88 183 8** - Médecin

Signature : _____ Date : _____

jj/mm/aaaa

Annexe 1 : Fiche technique

CIPROFLOXACINE (CIPRO®)

Nom générique	CIPROFLOXACINE
Mode d'action	Inhibiteur de l'ADN-gyrase. Agit contre les infections causées par les espèces sensibles : Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Proteus aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter.
Présentation	Adulte (16 ans et +) = comprimés de Cipro® (500mg ou XL 500mg ou XL 1000mg)
Prophylaxie	CIPRO® 500mg - Adulte (16 ans et +): 1 comprimé, 2 fois/jour, pour 1 à 3 jours si diarrhée importante ou si persistance de plus de 24 heures. CIPRO® XL 500mg - Adulte (16 ans et +): 2 comprimés, 1 fois/jour, pour 1 à 3 jours si diarrhée importante ou si persistance de plus de 24 heures. CIPRO® XL 1000mg - Adulte (16 ans et +): 1 comprimé, 1 fois/jour, pour 1 à 3 jours si diarrhée importante ou si persistance de plus de 24 heures.
Contre-indications	Voir ordonnance collective
Effets secondaires	Voir Annexe 3

DIARRHÉE DU VOYAGEUR

En cas de diarrhée (3 selles non formées en 24 heures):

1. Hydratation

Hydratez-vous à l'aide d'une solution de réhydratation, ex: Gastrolyte (utiliser de l'eau bouillie, de source ou traitée).

Conservation de la solution: 12 heures non réfrigérée 24 heures si réfrigérée.

Buvez régulièrement et assurez-vous que les urines soient pâles.

2. Repos

3. Alimentation

Évitez les produits riches en gras et en sucre ainsi que les produits laitiers.

Pour le bébé nourri au sein ou au biberon, ne rien changer.

Le jeûne n'est pas recommandé.

4. Utilisation de l'Imodium® (Lopéramide)

Peut être utilisé au début si vous avez à vous déplacer ou si la réhydratation et le repos ne suffisent pas.

Non indiqué si enfant de moins de 12 ans.

Non indiqué pour plus de 48 hrs.

Le Lomotil® (atropine-sulfate/diphénoxylate) doit être évité. Il est un narcotique et donc non-admissible dans certains pays.

D'autres symptômes peuvent survenir avec la diarrhée du voyageur, tels que:

Nausées, vomissements, mal de ventre, mucus ou sang dans les selles, faible fièvre (<38.5 buccal).

5. Antibiotiques

Ne sont pas recommandés d'emblée chez toutes les personnes.

Consultez un médecin si:

- Forte fièvre (> de 38.5 buccal) ou toute fièvre (peu importe l'intensité) si vous êtes dans une région où il y a risque de Malaria.
- Diarrhée qui ne s'améliore pas après 24 à 48 heures.
- Vomissements sévères pour plus de 12 heures.
- Signes de déshydratation: langue sèche, urines foncées ou moins fréquentes, diminution des larmes, bouche sèche, ou confusion.

Ciprofloxacine (Cipro®)

On vous a remis une prescription d'antibiotiques pour un auto-traitement dans l'éventualité où vous développeriez une diarrhée durant votre voyage.

À débiter si diarrhée modérée à sévère, ou qui persiste plus de 24 heures, malgré les consignes (voir Annexe 2).

Effets secondaires principaux de cette médication :

- Sensibilité augmentée aux rayons du soleil
- Troubles gastro-intestinaux (nausées, brûlements d'estomac, douleurs abdominales et diarrhée)
- Étourdissements
- Possibilité d'allergie

La prise d'antibiotiques a été associée à un risque augmenté de diarrhée causée par le C difficile. Ce risque est toutefois moins élevé dans la communauté que chez les patients hospitalisés.

Vous devez cesser le médicament si vous avez des engourdissements ou des symptômes neurologiques.

INDE ET ASIE DU SUD-EST

Bangladesh

Bhoutan

Brunei

Cambodge

Chine

Inde

Indonésie

Laos

Malaisie

Myanmar (Birmanie)

Népal

Pakistan

Philippines

Singapore

Sri Lanka

Thaïlande

Timor Oriental

Vietnam



INITIER UNE ORDONNANCE DE CIPROFLOXACINE (CIPRO®)

Date : _____
jj/mm/aaaa

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Téléphone : _____ Adresse : _____

Date de naissance : _____ RAMQ : _____
jj/mm/aaaa

Allergie(s) : _____

J'ai procédé à l'évaluation de la personne ci-haut mentionnée et elle est une candidate à la prise de Ciprofloxacine. Il n'y a aucune contre-indication à la prise de cette médication.

Cette personne a reçu l'enseignement relatif à la prise de cette médication et des effets secondaires potentiels. Traitement à commencer si vous présentez une diarrhée modérée à sévère ou qui dure depuis plus de 24 heures malgré les mesures.

CIPRO® 500MG
Adultes (16 ans et plus): 1 comprimé, 2 fois par jour, pour 1 à 3 jours.

CIPRO® XL 500 MG
Adultes (16 ans et plus): 2 comprimés, 1 fois par jour, pour 1 à 3 jours.

CIPRO® XL 1000 MG
Adultes (16 ans et plus): 1 comprimé, 1 fois par jour, pour 1 à 3 jours.

Nom et prénom de l'infirmier(ère) : _____

No. de permis OIIQ : _____ Téléphone : **450 444-1927**

Signature : _____ Date : _____
jj/mm/aaaa

Médecin répondant : **Dre Isabelle Boily**

No. de permis : **88 183 8** Téléphone : **450 444-2002**

Signature : _____ Date : _____
jj/mm/aaaa